

**Belpele**<sup>®</sup> (adapaleno). **Apresentações:** Gel – adapaleno 3 mg/g (0,3%) – embalagem contendo bisnaga com 30g. **Indicação:** Tratamento tópico da acne vulgar. **Contraindicações:** Hipersensibilidade aos componentes da fórmula ou da embalagem. Pacientes com eczema ou pele muito irritada. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem a orientação médica ou do cirurgião dentista. É contraindicado para menores de 12 anos de idade.

**Advertências e precauções:** Exclusivamente para uso externo. Evite o contato com os olhos, lábios, dobras do nariz, membranas mucosas e pele lesada. Os pacientes devem ser aconselhados a utilizar cosméticos não comedogênicos, devendo ser utilizados produtos de base aquosa somente. Os cosméticos devem ser removidos cuidadosamente antes que a pele seja tratada. Tal como outros retinoides, a exposição à luz solar excessiva, incluindo lâmpadas solares, deve ser evitada durante o tratamento. Se a exposição não puder ser evitada, é recomendável utilizar filtros solares eficazes e roupas apropriadas para proteger as áreas tratadas. Extremos de temperatura, vento e frio também podem ser irritantes para pacientes sob tratamento com adapaleno. O uso de ceras depilatórias deve ser evitado nas áreas tratadas. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião dentista. **Interações medicamentosas:** Belpele<sup>®</sup> tem leve potencial para irritação local e portanto é possível que o uso concomitante de limpadores abrasivos, produtos irritantes ou com efeito ressecante possam produzir efeitos irritantes adicionais. Deve-se ter especial cautela com o uso de medicamentos para tratamentos antiacne cutâneos tais como eritromicina, clindamicina fosfato 1% ou peróxido de benzoíla (até 10%) e/ou produtos contendo enxofre, resorcinol ou ácido salicílico em combinação com adapaleno tópico, sendo recomendável não iniciar o tratamento com adapaleno enquanto a pele ainda estiver afetada por estas substâncias. **Reações adversas:** Comuns: descamação, ressecamento, eritema, ardência e sensação de queimação. Incomuns: ressecamento e irritação da pele, eritema, ardência e sensação de queimação. Incomuns: dermatite de contato, desconforto na pele, prurido, esfoliação da pele e acne. Frequência não estabelecida: edema da pele, dor, irritação, prurido e inchaço nas pálpebras. **Posologia:** Lavar e secar bem a pele. Aplicar uma camada fina de Belpele<sup>®</sup> nas áreas afetadas pela acne uma vez por dia, antes de deitar. O tratamento deve ser interrompido se houver reação inflamatória local grave. O tratamento pode ser reiniciado com a melhora da reação, aplicando o produto de forma menos frequente a princípio, e depois retomando o esquema diário, de acordo com a tolerabilidade do paciente ao tratamento. Caso se esqueça de aplicar o produto, o paciente deve retomar a aplicação na noite seguinte, aplicando a quantidade usual de medicamento. **M.S:** 1.0390.0128. **Farmoquímica S/A.** SAC 08000 25 01 10. **VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.** Para ver o texto de bula na íntegra, acesse o site [www.fqm.com.br](http://www.fqm.com.br). **Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.** Material destinado exclusivamente aos profissionais de saúde habilitados a prescrever e dispensar medicamentos.

<b>Histórico de Revisões</b>		
Revisão	Data	Descrição
00	28/03/2014	Minibula elaborada conforme bula versão AR011113 - Roberta
01	29/10/2015	Minibula alterada conforme bula versão AR030615 - Bárbara